



AniDry+

Staldbundsdesinfektion

Sundt og tørt staldklima

AniDry+ er et dansk produkt, gennemtestet af internationalt anerkendte laboratorier. AniDry+ er fosfatfrit og netop derfor PH-neutralt, således at den ikke svider eller ætser gulv og stalddinventar. Og endnu vigtigere, den udtørre ikke dyrenes tynde hud – hvilket ellers kan give anledning til sprækker.

AniDry+ er skånsom overfor sine omgivelser, men har en veldokumenteret effekt på bakterier som E-coli, Salmonella, Camphylobacter, Staph.aureus, Streptococcus uberis, Aspergillus niger, Clostridium perfringens og Klebsiella pneumoniae.

AniDry+ binder ammoniak hvorved lugten af ammoniak reduceres markant så dyr og mennesker kan holde ud, at færdes i stalden, uden lugtgener og åndedrætsbesvær.

AniDry+ reducerer den samlede bakterieflora med 96-99% ifølge afprøvninger på stalddulve.

AniDry+ absorberer fugt og væde og er derfor særlig virksom i de våde vintermåneder og eventuelle regnfulde somre.

AniDry+ desinficerer og renser stalddmiljøet, reducerer smittetrykket og sikrer derved en sundere besætning.

AniDry+ kan anvendes til næsten alle husdyr (får og geder undtaget), og er næsten uundværlig i forbindelse med proffessionelt dyrehold.

AniDry+ skader hverken mennesker eller dyr. Al brug af handsker er overflødig.

- Dæmper ammoniaklugt
- Absorberer fugt og væde
- Desinficerer stalddmiljøet
- Effektiv over for bakterier og svampesporer
- Ikke slidende på gulv og inventar
- Støver minimalt

Unitron a/s



Work smarter – not harder

AniDry+

Staldbundsdesinfektion



Anvendelse

En håndfuld AniDry+ pr. m² 2 gange om ugen er nok til at opretholde et tørt og sundt staldklima. Ved særlig fugtige stalde eller sygdomsramte stalde anbefales det, at anvende AniDry+ hyppigere. Ved tvivl eller problemer kontakt os endelig. AniDry+ leveres i sække á 25 kg.

Et typisk forbrug er 50 g AniDry+ pr m². Sugevnen er så kraftig, at det kan udtørre flueæg og pupper. Ved behandling for fluer/æg/pupper/larver anvendes 150 g pr m² i tørre områder. Ved behandling for fluer/æg/pupper/larver anvendes 300 g pr m² i fugtige områder.

AniDry+ til kvæg og kalve

Strø en god nævefuld pr. m² (50-100 g) 2 gange om ugen. Dette vil virke kraftigt smittedæmpende i løbet af kort tid. Ved særlige fugtige forhold eller ved sygdomsudbrud forøges mængden og hyppigheden (daglig).

AniDry+ i bindestalden

Strø AniDry+ i bagerste del af lejet, hvor fugtighed giver mulighed for at visse bakterier og svampe kan reproducere i stort antal, og derved bl.a. forårsage yverbetændelse og forskellige klovlidelser.

AniDry+ i sengestalden

Anvend AniDry+ som nævnt ovenfor, men i bredere båse, hvor køerne kan vende sig, kan det være nødvendigt at bruge mere (hele båsen behandles).

AniDry+ i dybstrøelsestalden

Brug AniDry+ 1 gang om ugen med en god nævefuld (50-100 g pr. m²).

AniDry+ i kælvningsstalden

I den rengjorte kælvningsboks drysses AniDry+ over hele gulvarealet således at boksen er desinficeret. Herefter tilsættes ren og frisk strøelse og til slut tilsættes AniDry+ igen over hele arealet. Dette foretages mellem hver kælvning, således at de nyfødte kalve kælvnes i et så rent miljø som muligt.

AniDry+ hos kalve

Til kalveboksen bruges AniDry+ 2 gange om ugen. Strø en god nævefuld pr. m² (50-100 g). Sørg for at ramme kanten af boksen, hvor fluerne huserer.

Ved kontinuerlig brug af AniDry+ opnås de bedste resultater fordi smittetrykket hele tiden reduceres og derved opnås et godt og sundt staldmiljø – til glæde for såvel dyr og mennesker.

Unitron a/s



Unitron a/s, Kokmose 6, 6000 Kolding · Tlf. 75 80 21 22 · mail@unitron.dk · www.unitron.dk

Work smarter – not harder